

Sercial

Vass8R01s191-195



Collection Vassal-Montpellier


OMtp1056

8R1s-191-195  
Sercial

Sercial


8R1s-191-195













CLOS 8 RANG 1 Souche 191-195

Désignation : *sercial*

CHARGE : Année :

Véraison : 25.7 8  
Maturité : 22.8.88 +1

Mill.: 3 Pour.: 0

GRAPPE : G - (M) - (P) - Dim.: 12

(L) - M - C

Vigueur : 4

PORT : érig - 1/2 érig - (couché)

BAIE : Année :

TG - (G) - M - P - Dim.: 19x18

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 4 Avec pépins - apyrène

s2 4 JUS : inc. - coloré

s3 3

s4 4

s5 3

ANNEE 1988  
 NOM Sercial ll  
 ♀

EMPLACEMENT 8 R1 & 131-195

mi

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	21.3	25.3	4								
2	4	21.3	25.3	4								
3	3	21.3	25.3	3	10	27.5	31.5	36	25.7	28.7	1.8	22.8
4	3	21.3	25.3	4								
5	4	21.3	25.3	3								

25.3  
 +1  
 Pourriture : 0  
 Port : mi erige à l'écoupe  
 Vigueur : 4 vigoureux  
 +1

ANNEE 1989  
 NOM Sercial B  
 mi

EMPLACEMENT 8 R1 & 131-195

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	8.3	13.3	3			22.5	24.5				
2	4	8.3	13.3	2			22.5	24.5				
3	4	13.3	16.3	6	10	18.5	22.5	24.5	10.7	17.7	14.7	18.8
4	4	13.3	16.3	2			22.5	24.5		0		+1
5	4	13.3	16.3	8			22.5	24.5				

Pourriture : 0  
 Mill. : 80%  
 Port : l'écoupe  
 Vigueur : 4  
 D de 15.3.89 - 3



ANNEE 1990

NOM Sercial bl

EMPLACEMENT 8 R 1 A 191-195

Souches	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	26.2	1.3	3								
2	6	26.2	5.3	3								
3	6	26.2	5.3	1	5	16.5	17.5	18.5	16.7	20.7	23.7	20.8.90
4	4	26.2	5.3	3			-3					
5	6	26.2	1.3	5						+3		+2
	28.5	26.2	3.3	90(-6)	15							

Pourriture : 0

Mill. : 60% Port :

Vigueur :



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

838  
Année :2010  
Code cépage : 0Mtp1056 \ NomVar : Cépage non identifié  
Nom introduction :Sercial \ Emplacement :Vass8R01s191-195

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7 (sur 2 coursons)		25/3		
2	2 S. Adulte Vieille		26/3		
3	6 (Pointe de souche en tête de souche)		26/3 30/3		
4	2	1200/26/3	30/3		
5	1 Rangée tête de souche		\	\	\
Moyenne			28/3		

- 1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			26/07	2/08	26/8	

+ 2

=



# **Formulaire de description 4 / 8**

*Observation entre stades de nouaison et de véraison*

Année : 2010

Observateur : *Laumbe*

Programme : GrapGene06

Code introduction : 0Mtp1056

Nom introduction : Sercial

Emplacement : Vass8R01s191-195

## **LIMBE**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille	Très petite	Petite	<u>Moyenne</u>	Grande	Très grande
Oiv 067	Forme du limbe	1-Cordiforme	2-Cunéiforme	3-Pentagon.	<u>4-Orbicul.</u>	5-Rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	1-F. entière	2-Trois	<u>3-Cinq</u>	4-Sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure limbe		Vert clair	<u>Vert moyen</u>	Vert foncé	
Oiv 070	Pigmentation anthocyanique (rouge) des nervures, face supérieure	<u>1- Nulle</u>	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 <sup>ère</sup> bifurc.	4- Après 1 <sup>ère</sup> bifurc.	<i>rose</i>
Oiv 071	Pigmentation anthocyanique (rouge) de nervures, face inférieure	<u>1- Nulle</u>	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 <sup>ère</sup> bifurc.	4- Après 1 <sup>ère</sup> bifurc.	
Oiv 074	Profil du limbe	<u>1-Plan</u>	2-En V	3-Involuté	4-Révoluté	5-Tourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entre nerv I ou II)	<u>Absente</u>				Présente
Oiv 072	Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II)	<u>Absente</u>				Présente
Oiv 075	Cloûre du limbe, face sup. (relief entre nervures de dernier ordre)	Nulle à t. fb.	<u>Faible</u>	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	<u>Faible</u>	<u>Moyenne</u>	Forte	Très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	<u>Faible</u>	<u>Moyenne</u>	Forte	Très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	<u>Faible</u>	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	Faible	<u>Moyenne</u>	Forte	Très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.principales face sup	<u>Absente</u>				Présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales face sup	<u>Absente</u>				Présente
Vassal	Densité p. couchés limbe face sup.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Vassal	Densité p. dressés limbe face sup.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

## **PETIOLE**

Oiv 090	Densité poils couchés	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 091	Densité poils dressés	Nulle à t. fb.	<u>Faible</u>	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervure médiane	Beaucoup plus court	Plus court	Égal	<u>Plus long</u>	Beaucoup plus long
Vassal	Couleur du pétiole	1-coloré	<u>2-partiellement coloré</u>	3-vert		

**SINUS PETIOLAIRE** (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 079	Ouverture	1-très ouvert	<u>2-ouvert</u>	3- peu ouvert	4- fermé	5- lobes très chevauchants	6- lobes très chevauchants
Oiv 080	Forme de la base		1- en U	<u>2- en accolade</u>	3- en V		
Oiv 81-1	Dent sur le bord		<u>1-Absence</u>	2- Présence assez fréquente de 1 ou 2 dents			
Oiv 81-2	Base dégarnie		<u>1-Absence</u>	2- sur 1 côté	3- sur 2 côtés		

**SINUS LATéraux SUPERIEURS** (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 082	Ouverture	1- absence de sinus	2- ouverts	<u>3- fermés</u>	4- lobes très chevauchants		
Oiv 094	Profondeur des sinus latéraux supérieurs	<u>Absence</u>	Peu profond	Moyens	<u>Profonds</u>	Très profonds	
Oiv 83-1	Forme	<u>1-en U</u>	2- en accolade	3- en V			
Oiv 83-2	Dent	<u>1-Absence</u>	2- Présence fréquente				

**DENTS** (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 076	Forme	<u>1- côtés concaves</u>	2- côtés rectilignes	3- notations 2 + 4	4- côtés convexes	5- un côté concave et l'autre convexe	
Oiv 077	Taille	Très petites	<u>Petites</u>	Moyennes	Grandes	Très grandes	
Oiv 078	Rapport longueur/largeur	Très courtes	Courtes	<u>Moyennes</u>	Longues	Très longues	

**AUTRE CARACTERE OBSERVABLE A CETTE PERIODE**

Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible (<10%)	<u>Faible (11-30%)</u>	Moyen (31-50%)	Élevé (51-70%)	Très élevé (>80%)	
---------	--	--------------------	------------------------	----------------	----------------	-------------------	--



# Formulaire de description 5 / 8

Observation à maturité physiologique

Année : 2010.

Observateur : *TD sur table*

Programme : GrapGene06

Code introduction : 0Mtp1056

Nom introduction : Sercial

Emplacement : Vass8R01s191-195

## GRAPPE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur Valeur absolue (en cm) : <i>15 cm</i>	Très courte ( $<10$ cm)	Courte (10-14 cm)	Moyenne (14-18 cm)	Longue (18-25 cm)	Très longue ( $>25$ cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm) : <i>4 cm</i>	Très étroite ( $<5$ cm)	Etroite (5-10 cm)	Moyenne (10-15 cm)	Large (15-20 cm)	Très large ( $>20$ cm)
Oiv 204	Compacité	Très lâche	Lâche	Moyenne	Compacte	Très compacte
Vassal	Millerandage	Nul ou t. fb.	Faible	Moyen	Fort	Très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule <i>8</i>	Très court ( $<3$ cm)	Court (3-5 cm)	Moyen (5-7 cm)	Long (7-10 cm)	Très long ( $>10$ cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	Base seulement		Moitié	Plus de la moitié	
Vassal	Couleur de l'axe de la rafle	1-Coloré	2-Non color			
Oiv 208	Forme de la grappe	1-Cylindrique	2-Conique ou pyramidale	3-En entonnoir		
Oiv 209	Présence d'un aileron	1-Absent	2- Une à trois ailes	3- Plus de trois ailes		

## BAIE

Oiv 220	Longueur Valeur absolue (en cm) : 20			Très courte ( $<8\text{mm}$ )	Courte (8-14mm)	Moyenne (14-20mm)	Longue (20-26mm)	Très longue ( $>26\text{mm}$ )	
Oiv 221	Largeur Valeur absolue (en cm) : 16			Très étroite ( $<8\text{mm}$ )	Etroite (8-14mm)	Moyenne (14-20mm)	Large (20-26mm)	Très large ( $>26\text{mm}$ )	
Oiv 222	Uniformité de la grosseur			1-Non uniforme	3-Uniforme				
Oiv 223	Forme	1- Aplatie	2- Arrondie	3- Elliptique	4- Ovoïde	5- Tronc- ovoïde	6- Obovoïde	7- Cylindrique	8- Arquée
Oiv 225	Couleur épiderme		1- Vert-jaune	2- Rose	3- Rouge	4- Gris	5- Rouge-Violet	6- Bleu-Noir	
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme			1- Non uniforme	3- Uniforme				
Oiv 227	Pruine			Nul ou t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte	
Oiv 228	Epaisseur pellicule			Très mince	Mince	Moyenne	Epaisse	Très épaisse	
Oiv 229	Ombilic (apparence)			1- Peu apparent	2- Apparent				
Oiv 229	Ombilic (dépression)			1- Déprimée	2- Non déprimée				
Oiv 230	Coloration de la pulpe			1-Non colorée	2- Colorée				
Oiv 231	Intensité de la coloration de la pulpe			Non colorée	Faible coloration	Moyenne coloration	Forte coloration	Très forte coloration	
Oiv 232	Succulence de la pulpe			1- Peu juteuse	2- Juteuse				
Oiv 233	Rendement en jus (ml / 100g baies)				Faible	Moyen	Elevé		
Oiv 235	Fermeté de la pulpe			Très faible	Faible	Moyenne	Elevée	Très élevée	
Oiv 236	Saveur			1-Aucune	2- Muscatée	3- Foxée	4- Herbacée	5-Autre	
Oiv 238	Longueur pédicelle			Très court ( $<4\text{mm}$ )	Court (4-8mm)	Moyen (8-12mm)	Long (12-16mm)	Très long ( $>16\text{mm}$ )	
Oiv 240	Séparation du pédicelle			Très facile	Facile	Moyen	Difficile	Très difficile	

## PEPINS

Oiv 241	Présence de pépins	1- Absents (type corinthien)		2- Rudimentaires (type sultanien)		3-Présents
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : 7	Très courts	Courts	Moyens	Longs	Très longs
Oiv 243	Poids d'un pépin (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) : -----	Très faible ( $<10\text{mg}$ )	Faible (25mg))	Moyen (40mg)	Elevé (55mg)	Très élevé ( $>65\text{mg}$ )
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-Absentes	2-Présentes			



Jan 2016  
Pas obs. feuille

**Formulaire de description 6 / 8**  
(après chute des feuilles)

Année : ~~2010~~ 22/12/2016

Observateur : OM

Programme : GrapGene06

Code introduction : 0Mtp1056

Nom introduction : Sercial

Emplacement : Vass8R01s191-195

*Sarment*

oiv 101 **section transversale** : circulaire ~~1~~ - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée ~~2~~ - striée 3.

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre ~~2~~ - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes ~~1~~ - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence ~~P~~ - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence ~~D~~ - présence 9.

oiv 351 **vigueur \*** : très faible 1 - faible 3 - moyenne ~~5~~ - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte ~~9~~.

oiv 353 **longueur entrenœuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) ~~3~~ - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 80 mm

oiv 354 **diamètre entrenœuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) ~~3~~ - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 7 mm

*Suppléments pour Porte-greffe*

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

*Vassal :*

**Noeuds** : aplatis 1 - moyens ~~2~~ - saillants 3.

**Pruine sur sarment** : absence ~~1~~ - partiellement présente 2 - présente 3.

\* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Sercial  
d 8 R1 s 191. 195 (s. 194)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -  
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 198 - sans villosité  
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -  
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé  
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Stalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -  
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité  
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -  
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -  
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2<sup>ème</sup> et de la 3<sup>ème</sup> feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -  
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -  
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -  
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -  
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -  
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou  
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -  
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans  
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Sercial

8 R 1 s - 191-195 (s. 191)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre (242) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -  
sêteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 248 - cotonneux 249.  
sans villosité pubescente (288) - sans villosité laineuse (289).  
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré (248) - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré (251) - à raies 252 - vert 253.

Nœuds : dos coloré (254) - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré (257) - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte (260) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé (263) <sup>base</sup>.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré (264) <sup>petit</sup> - vert (265) <sup>ou</sup>

( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Sercial

8 R 4s-491-495 (n. 492)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
~~sans~~ villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
~~sans~~ villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.  
partiellement - totalement.

Calvo 87



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Sercial

8 R 1s - 191-195 (s. 191)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 14 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 22 x 19).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde

truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 87



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

*Sercial*  
*8 R 1 A 191. 195 (2.3)*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : .....<sup>11</sup>... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 88*



N° d'ordre :

Désignation : *Sercial*

Emplacement : *8 R 1 s 191-195*

Angle des nervures : (1) - (2) - 3  
Sexe : 4 - (5) - 6  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : (7) - (8) - 9  
L<sub>2</sub>/L : (10) - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - (16)  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)  
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - (36) - (37) - (38) - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - (41)  
Dents (angle) : (42) - (43) - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb de dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - (52) - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

*Rennes 90*